

CLINICAL FRAILTY SCALE NORWEGIAN

	1	VELDIG SPREK	Personer som er robuste, aktive, energiske og motiverte. De trener gjerne regelmessig, og er blant de sprekest i sin aldersgruppe.
	2	SPREK	Personer som ikke har aktive sykdomssymptomer, men er mindre spreke enn kategori 1. De kan ofte trenere eller være veldig aktive av og til, f.eks. sesongbasert.
	3	KLARER SEG BRA	Personer med velkontrollerte medisinske problemer, selv om de kan ha symptomer av og til. De er ikke regelmessig aktive utover vanlig gange.
	4	LEVER MED SVÆRT MILD SKRØPELIGHET	Tidligere «sårbar». Denne kategorien markerer en overgang fra å være helt selvstyrte. Selv om de ikke er avhengig av daglig hjelpe fra andre, vil symptomer begrense aktivitet . De klager ofte over at de er «langsommere» og ofte blir slitt/trette i løpet av dagen.
	5	LEVER MED MILD SKRØPELIGHET	Disse er mer tydelig langsomme, og trenger hjelpe til komplekse aktiviteter i dagliglivet (personlig økonomi, transport, tungt husarbeid). Vanligvis vil mild skrøpelighet i økende grad føre til problemer med å handle eller gå utenfor hjemmet alene, lage mat, håndtere medisiner, og begynner å begrense lett husarbeid.
	6	LEVER MED MODERAT SKRØPELIGHET	Personer som må ha hjelpe til alle aktivitetene utenfor hjemmet og med å stelle hjemmet. Innendørs har de ofte problemer med trapper, trenger hjelpe til badning/dusj og kan trenge litt hjelpe til å kle på seg (veileddning, tilsyn).
	7	LEVER MED ALVORLIG SKRØPELIGHET	Helt avhengige av hjelpe til personlig stell uansett årsak (fysisk eller kognitiv). Likevel fremstår de som stabile og uten høy risiko for å dø (innen ~6 måneder).
	8	LEVER MED SVÆRT ALVORLIG SKRØPELIGHET	Helt avhengige av hjelpe til personlig stell og nærmer seg livets slutt. Vanligvis vil de ikke komme seg igjen selv etter mild sykdom.
	9	TERMINALT SYK	Nærmer seg livets slutt. I denne kategorien inngår personer med en forventet levetid <6 måneder uten at de lever med alvorlig skrøpelighet. (Mange terminalt syke pasienter kan være fysisk aktive inntil de er svært nære døden).

SKÅRING AV SKRØPELIGHET HOS PERSONER MED DEMENS

Graden av skrøpelighet ble vurderet ved å legge til den graden av demens (CFSS 5,6,7 eller 8). Vanlige symptomer ved mild demens inkluderer det å gleme detaljer rundt en mylg hendelse, selv om man husker selve hendelsen, å gjenta de samme spørsmålene flere ganger og sosial tilbaketrekkning.

Ved moderat demens er kortføreminn svært svekket, selv om de viker å huske hendelser fra tidligere i livet. De kan være utsatt for eksempl. enkle regneark. Ved alvorlig demens må de ha hjelpe til all egenomsorg.

Clinical Frailty Scale © 2005-2020 Rockwood, Version 2.0 (NO). All rights reserved. For permission: www.genotricmedicineandresearch.ca Translated with permission by Røstoft S, Engedal TT, Syrbe B, Flaatton H. Rockwood K et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ 2005;173:489-495.

